



**ОПАСНО!**

**Пневмококковая  
инфекция!**

# Какие заболевания вызывает пневмококк?



**МЕНИНГИТ** (воспаление твердой оболочки мозга). Симптомы менингита включают в себя лихорадку (повышение температуры тела до 38°С и выше), спутанность сознания, светобоязнь (повышенная чувствительность к свету), отказ от еды, срыгивание, рвоту, громкий крик (ребенок буквально не дает дотрагиваться до себя, заходится криком от любого прикосновения), напряжение затылочных мышц (невозможно нагнуть голову вперед, голова самопроизвольно запрокидывается назад).

**БАКТЕРИЕМИЯ** (заражение крови). Симптомы могут совпадать с симптомами пневмонии и менингита, обязательно наличие лихорадки до 39° и выше. Также могут наблюдаться боль в суставах, озноб, боль в животе, тошнота, рвота, понос (диарея). Насморк, боль в горле, конъюнктивит могут отсутствовать.

**ПНЕВМОНИЯ** (воспаление легких). Пневмония сопровождается лихорадкой, кашлем, одышкой (частое дыхание), болью в груди, общей слабостью.

**ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ** (воспаление среднего уха). При отите ребенок беспокоен, отказывается от еды, не может сосать грудь или соску, резко отдергивает голову, крутит головой, плачет "дерет" уши. Наблюдаются повышение температуры тела (до 38° С и выше). Плач при попытке надавливания на козелок, вытекание жидкости и гноя из уха.

**Риск развития заболеваний, вызванных пневмококковой инфекцией, повышен, если это:**

- Дети первых 2-х лет.
- Недоношенные дети.
- Дети с хроническими заболеваниями.



- Дети на искусственном и смешанном вскармливании.
- Дети из семей, где проживает больше одного ребенка.
- Дети, посещающие организованные коллективы - ясли, детские сады, группы развития.
- Дети и взрослые закрытых учреждений, в том числе и военнослужащие.

## **Как можно предотвратить пневмококковую инфекцию..**

В настоящее время доступна вакцинация для детей, подростков и взрослого населения.

Прививка входит в Национальный календарь профилактических прививок для детей с 2-х месячного возраста и для лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Вакцинации подлежит население согласно Национального календаря РФ и вакцинация показана людям с:

- аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма и др).
- заболеваниями органов дыхания (хроническая пневмония, ХОБЛ), заболеваниями сердечно - сосудистой системы, почек, суставов.
- заболеваниями ЛОР - органов (фарингиты, тонзиллиты, отиты, синуситы).
- врожденными пороками развития (в том числе пороками сердца).
- иммунодефицитными состояниями.
- ВИЧ - инфекций (или детям, рожденным от ВИЧ - инфицированных матерей).
- онкогематологическими заболеваниями или длительно получающими терапию, резко снижающую иммунитет.

## **Противопоказания к вакцинации:**

1. Повышенная чувствительность на предшествующее введение вакцины (в том числе анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции).
2. Повышенная чувствительность к дифтерийному анатоксину.
3. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний. Вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии.



ГБУЗ “Южно - Сахалинская детская городская  
поликлиника”  
Кабинет медицинской профилактики.